

デュロキセチンカプセル・OD錠 20mg/30mg「ニプロ」 「効能・効果」および「用法・用量」追加承認取得のお知らせ

ニプロ株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長:佐野 嘉彦)は、デュロキセチンカプセル・OD錠 20mg/30mg「ニプロ」につきまして、2021年6月16日付で、以下のとおり、効能・効果および用法・用量を追加承認取得いたしましたことを、お知らせいたします。

これにより、先発品と効能・効果が同一になりました。

〔承認内容〕 ※下線部分が追加となりました

	追加承認取得後	追加承認取得前
効能・効果	<ul style="list-style-type: none"> ○うつ病・うつ状態 ○下記疾患に伴う疼痛 糖尿病性神経障害 線維筋痛症 <u>慢性腰痛症</u> <u>変形性関節症</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ○うつ病・うつ状態 ○下記疾患に伴う疼痛 糖尿病性神経障害 線維筋痛症
用法・用量	<p>〈うつ病・うつ状態、糖尿病性神経障害に伴う疼痛〉 現行のとおり</p> <p>〈<u>線維筋痛症に伴う疼痛、慢性腰痛症に伴う疼痛、変形性関節症に伴う疼痛</u>〉 通常、成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして60mgを経口投与する。投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する。</p>	<p>〈うつ病・うつ状態、糖尿病性神経障害に伴う疼痛〉 現行のとおり</p> <p>〈線維筋痛症に伴う疼痛〉 通常、成人には1日1回朝食後、デュロキセチンとして60mgを経口投与する。投与は1日20mgより開始し、1週間以上の間隔を空けて1日用量として20mgずつ増量する。</p>

ニプロは今後とも、患者さまのQOL(Quality of life)向上はもちろんのこと、より安全で、社会のニーズに応えられる製品の開発、提供に努めてまいります。

お問い合わせ先

リリースの内容に関するご照会 : 広報担当

TEL 06-6375-6700

医薬品に関するご照会 : 学術情報部

TEL 06-6375-6731

※受付時間 9時~17時45分(土・日・祝日・弊社休業日を除く)